apice basi styli brevi pyramidali hispidula coronata, basi breviter stipitata 1½ mm longa.

West-Australien: An feuchten moorigen Stellen am Swan River bei Andrews und in der Ebene bei Albany (Plantagenet), 30. IX. und 30. X. 1839 (Preiss n. 1763!); Serpentine River an Wasserfällen, 1. XII. 1877 (F. Mueller!); King George's Sound (Maxwell, Oldfield); Murchison River (Oldfield! in herb. mus. vindob.); ohne Standortsangabe (A. W. Howitt! in herb. mus. phytol. Melbourne).

20. ***Cl. Milnei*** C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 46. — *Mariscus Milnei* Fernald in Rhodora XXV (1923) 54. — Culmus 60—100 cm altus 4—5 mm latus compressus anceps. Folia caulina 2 culmum interdum superantia 5 mm lata plana, vaginae longae stramineo-virentes. Panicula 30—50 cm longa angusta laxa, e fasciculis 5 ramorum remotis constructa, rami fasciculorum superiorum bini vel terni inaequales elongati, ramus fasciculi imi unicus bractea longa foliacea longe vaginante suffultus. Bracteae superiores decrescentes. Ramuli graciles vix flexuosi minute scabridi; bracteolae spathaceae striatae brunneae minute asperae. Spiculae 1—3-nim congestae parvulae ovatae 3 mm longae 1—2-florae (1-nucigerae). Squamae ovatae acutae fusco-ferrugineae minute scabrae. Basis styli conica dense sericea $^2/_5$ nucis aequans persistens. Nux ovata turgido-trigona cum basi styli 2 mm longa rufescens paullo crustacea basi rotundata brevissime stipitata.

Melanesien: Neue Hebriden: Insel Aneiteum (Milne in herb. Kew.). Insel Eromanga, Dillon Bay 400 m, 29. V. 1928 (S. F. Kajewski n. 327!).

21. ***Cl. ensigerum*** Hanec in Journ. of Bot. XXIII (1885) 80; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXXVI (1903) 262. — *Mariscus ensiger* Fernald in Rhodora XXV (1923) 53. — Rhizoma repens horizontale 4—6 mm crassum squamis lanceolatis scariosis griseo-fuscis acuminatis tectum, fibrillis rigidis. Culmus 40 cm longus complanatus tantum basi foliatus. Folia rigida sursum accrescentia basi equitantia, inferiora ad vaginas reducta, superiora culmum aequantia 6—22 mm lata basi complicata, superne plana acuminata multinervia inferne purpureo-marginata, marginibus minute scabro-denticulata. Panicula angusta; rami plerumque terni. Spiculae 10—12 mm longae 2—3-florae. Squamae ovato-lanceolatae acuminatae purpurascentes. Basis styli crassa albo-squamulata persistens. Nux ellipsoidea trisulcata subdrupacea.

Südchinesisches Küstenland: Hongkong, beim Dorfe Pok fu lum, I. und V. 1883 (C. Ford in herb. Kew., in herb. Hance n. 22181).

22. ***Cl. micranthes*** C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 46. — *Mariscus micranthes* Fernald in Rhodora XXV (1923) 54.